

MEDICAMENTOS OTOTÓXICOS

Los pacientes con algún grado de pérdida auditiva deben evitar en lo posible el tratamiento con los siguientes fármacos.

Antibióticos:

Aminoglucósidos (Amikacina, Gentamicina, Kanamicina, Neomicina, Netilmicina, Estreptomicina, Tobramicina).

Ampicilina, Capreomicina, Cloramfenicol, Colistina (polimixina E), Eritromicina, Minociclina, Polimixina B, Rifampicina, Vancomicina, Teraciclinas.

Antiinflamatorios: Fenoprofeno, Ibuprofeno, Indometacina, Naproxeno, Fenilbutazona, Salicatos (aspirina, coudina, etc).

Antimaláricos: Cloroquina, Quinina.

Agentes antitumorales: Actinomicina, Bleomicina, Cisplatino, Mostazas nitrogenadas (ej. mustina), Misonidazol, Vincristina, Vinblastina.

Beta-bloqueantes: Propanolol.

Anticonceptivos: Medroxiprogesterona.

Diuréticos del ASA: Bumetanida, Ácido etacrínico, Furosemida.

Desinfectantes: Cloruro de Benzalconio, Cloruro de Benzetonio, Clorhexidina y compuestos yodados.

Antidepresivos tricíclicos: Imipramina, Nortriptilina.

Miscelánea: Alcohol, Nicotina (en tabaco).